



Cardiopirin

Acidum acetylsalicylicum

Cardiopirin (*Acidum acetylsalicylicum*). **Skład i postać:** jedna tabletkowa dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego. **Wskazania:** prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego, profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy, zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) (ang. *coronary artery bypass grafting* – CABG), angioplastyka wieńcowa z wyjątkiem ostrej fazy, profilaktyka

przebiegiem niedokrwienia niedokrwienia mózgowo-warunkiem wykluczenia zgowych. Cardiopirin nie przypadkach. Jego za- się do prewencji wtórnej

Przeciwwskazania:

stancję czynną lub na pomocniczą; czynny lub na- w wywiadzie i/lub krwawienia innego rodzaju krwawienia, takie wch; skaza krwotoczna; choroby hemofilia i/lub trombocytopenia; ciężkie trzeci trymestr ciąży; u pacjentów z napadami łąnymi podaniem salicylanów lub substancji o po- leków przeciwzapalnych; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpie- nia zespołu Reye'a – rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. **Podmiot odpowiedzialny:** PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska Numer pozwolenia (MZ) na dopuszczenie do obrotu: 75 mg – pozwolenie nr 20895; 100 mg – pozwolenie nr 20896. Informacji o leku udziela: VP Valeant Sp. z o.o. sp. j., Biuro Marketingu i Sprzedaży, Budynek New City, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, tel. 22 627 28 88.



wtórna u pacjentów po przebyłym mózgu (TIA) i incydentach -naczyniowego (CVA), pod krwawień wewnątrzmo- jest zalecany w nagłych stosowanie ogranicza w leczeniu przewlekłym. nadwrażliwość na sub- którąkolwiek substancję wracający wrzód trawienny z przewodu pokarmowego lub jak krwawienia z naczyń mózgo- związane z krzepnięciem, takie jak zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek; tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywo-

dobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.